

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA

DEFINICIÓN

Es el número de muertes maternas por cada 100.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un periodo considerado.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$RMM_e^t = \frac{DM_e^t}{NAV_e^t} * K$$

Donde:

RMM_e^t = Razón de mortalidad materna por grupos de edad quinquenales (e) en un periodo determinado (t).

DM_e^t = Número de defunciones maternas por grupos de edad quinquenales (e) en un periodo determinado (t).

NAV_e^t = Estimaciones de nacimientos por grupos de edad quinquenales (e) de la madre en un periodo determinado (t).

$K = 100.000$

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Mortalidad materna.- Se define como la defunción de una mujer en edad fértil durante el embarazo, parto, puerperio (hasta 42 días), entre los 43 días a 11 meses después del parto o aborto, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no debido a causas accidentales o incidentales.

- 1) Defunciones obstétricas directas.- Son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de embarazo (embarazo, trabajo de parto, puerperio y aborto), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.
- 2) Defunciones obstétricas indirectas.- Son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Nacidos vivos.- Se entiende por nacido vivo, a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, prescindiendo de la duración del embarazo de un producto de la concepción, que después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida a la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considerará nacido vivo.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

La razón de muertes maternas se la obtiene de dividir el número de defunciones de mujeres en edad fértil en grupos de edades quinquenales (e) en un año o periodo determinado (t), por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, para el número de nacimientos estimados de

mujeres en edad fértil en grupos de edad quinquenales (e) en un periodo determinado (t); multiplicado por cien mil nacidos vivos.

LIMITACIONES TÉCNICAS		<p>Las proyecciones de nacidos vivos (CPV) corresponden a las mujeres del rango de edad 15 – 49 años.</p> <p>Las desagregaciones de este indicador por grupos de edad quinquenales se realiza para el rango de edad 15 – 49 años.</p> <p>A niveles más desagregados el indicador puede presentar valores muy altos que no necesariamente reflejan la coyuntura.</p>
UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES		Razón
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR		En el año 2011, existen 70 muertes maternas de mujeres de 10 a 49 años por cada 100.000 nacimientos estimados.
FUENTE DE DATOS		INEC: Estimaciones de nacimientos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010 (CPV 2010), y Registro Estadístico de Defunciones.
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS VARIABLES		Anual
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS		1990 – 2011
NIVEL DE DESAGREGACIÓN	GEOGRÁFICO	Nacional y provincial
	GENERAL	N/A
	OTROS ÁMBITOS	N/A
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA		N/A
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL O ACUERDOS, INICIATIVAS INTERNACIONALES		
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR		Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC.
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA		08/06/2012

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA	20/01/2014.	
CLASIFICADOR SECTORIAL	Salud.	15
ELABORADO POR	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	