



• www.inec.gov.ec •

ESPAC 2008
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua



ECUADOR CUENTA CON EL INEC

SÍNTESIS METODOLÓGICA

SÍNTESIS METODOLÓGICA

1. INTRODUCCIÓN

El sector agropecuario continúa siendo de vital importancia para la economía del país y es evidente que existen restricciones socio-culturales, económicas, técnicas e institucionales para planificar el desarrollo sustentable del sector. Además, el país está viviendo los procesos de globalización mundial de la economía, liberalización y apertura de mercados y regionalmente la liberalización de Libre Comercio. Por tanto, el desarrollo sustentable, la operación eficiente y apertura transparente de mercados requiere disponer de un sistema de información estadístico que sea objetivo, confiable y sobre todo, oportuno.

Dentro de este contexto, después de la realización del III Censo Nacional Agropecuario elaborado en el 2,000, la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC, tiene como finalidad satisfacer la demanda de información agropecuaria, facilitando de esta manera el monitoreo permanente del sector.

1.1 Objetivo

- Determinar la estructura actual del sector agropecuario mediante la generación de información sobre variables de evolución lenta.
- Proveer de información suficiente que permita el monitoreo permanente de la dinámica del sector.
- Contribuir al fortalecimiento de las políticas sobre normas de precios, que conlleven al mejoramiento de la producción agropecuaria.

2. DEFINICIONES BÁSICAS

A continuación se mencionan algunos conceptos y definiciones utilizados en la ESPAC:

Unidad de Producción Agropecuaria UPA: Es una extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad económica, que desarrolla su actividad bajo una dirección o gerencia única independientemente de su forma de tenencia o ubicación geográfica utilizando los mismos medios productivos. Superficies menores a 500 m² que mantengan características de las UPAs descritas, pero que hayan vendido un producto, durante el período de referencia.

Uso del suelo: Corresponde al estado bajo el cual se encontró la tierra de la Unidad de Producción Agropecuaria en el día de la entrevista. Este estado se clasifica de la siguiente manera:

Cultivos permanentes o perennes: Son aquellos cultivos que se plantan y después de un tiempo relativamente largo llegan a la edad productiva. Tienen un prolongado período de producción que permite cosechas durante varios años, sin necesidad de ser sembrados o plantados nuevamente después de cada cosecha.

Cultivos transitorios o de ciclo corto: Son aquellos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de algunos meses y una vez que llegaron a dar su fruto, la planta se destruye siendo necesario volverlos a sembrar para obtener una nueva cosecha.

Tierras en barbecho o rastrojo: Se encuentran sin cultivos (en reposo), siempre que el período de permanencia en este estado, calculado hasta el día de la entrevista, sea menor de un año.

Tierras en descanso: Son aquellas tierras que habiendo sido cultivadas anteriormente, se las dejó de cultivar en forma continua durante un período comprendido entre uno a cinco años, hasta el día de la entrevista, no se encuentran ocupadas por cultivo alguno.

Pastos cultivados: Son los pastos sembrados que rebrotan después de haber sido cortados o usados para el pastoreo. Se destinan, prácticamente en su totalidad, para alimento del ganado.

Pastos naturales: Son los pastos que se han establecido y desarrollado de modo natural o espontáneo, con la intervención de los agentes naturales (agua, viento, etc.). Si hay tierras en las cuales ha crecido árboles o arbustos y son aprovechados principalmente como alimento del ganado, éstos serán clasificadas como pasto natural.

Páramos: Son las tierras altas del callejón interandino cubiertas por vegetación típica de los páramos andinos (paja de páramo) que suele usarse para pastoreo extensivo.

Montes y bosques: Es toda vegetación arbustiva o boscosa, natural o plantada; que puede tener valor por su leña, madera u otros productos, o por razones ecológicas.

Otros usos de la tierra: Son categorías de aprovechamiento de la tierra, no clasificada en los grupos anteriores.

Cultivos asociados: Corresponde a la práctica generalizada de siembra entrecruzada de dos o más productos que comparten una misma superficie.

Mano de obra: Se refiere a las personas cuyos servicios han sido utilizados en la UPA, permanente u ocasionalmente, para efectuar trabajos agropecuarios.

3. VARIABLES INVESTIGADAS Y PERÍODOS DE REFERENCIA

La ESPAC proporciona información básica de las siguientes variables:

- Uso del suelo, en el día de la entrevista;
- Área plantada o sembrada, cosechada (sola y asociada), producción y ventas de los productos agrícolas, correspondientes al año de la investigación;
- Existencia de ganado vacuno, en el día de la entrevista;
- Movimiento del ganado vacuno, desde el 1 de enero al día de la entrevista;
- Producción y destino de la leche, en el día anterior al de la entrevista;
- Existencia de ganado porcino y ovino, en el día de la entrevista;
- Ventas de ganado porcino y ovino, desde el 1 julio al 30 de septiembre;
- Existencia de ganado: asnal, caballar, mular y caprino, en el día de la entrevista;
- Existencia de aves de campo y plánteles avícolas, en el día de la entrevista;
- Ventas y autoconsumo de aves de campo y de plánteles avícolas, desde el 1 julio al 30 de septiembre;
- Producción, autoconsumo, ventas y otros referente a huevos de gallina, en los últimos 7 días anteriores al de la entrevista;
- Empleo en la Unidad de Producción Agropecuaria, en la semana anterior al día de la entrevista.

4. RESUMEN METODOLÓGICO

Las investigaciones agropecuarias llevadas por el INEC hasta 1,995 utilizaban el método estadístico denominado Muestreo Estratificado de Áreas.



Para el III Censo Nacional Agropecuario CNA del 2,000 se utilizó la técnica denominada Muestreo de Marco Múltiple; que consiste en el uso combinado entre el Muestreo de Marco de Áreas (MMA) y Muestreo de Marco de Lista (MML). Todas las UPAs: grandes, sectoriales o localizadas y especiales fueron investigadas por el Muestreo de Marco de Lista y las restantes unidades fueron investigadas a través del Muestreo de Marco de Áreas.

La ESPAC con el propósito de utilizar la infraestructura y estructura del CNA utiliza la misma metodología del Muestreo de Marco Múltiple.

La metodología del Muestreo de Marco Múltiple es sumamente objetiva y eficiente para alcanzar alta precisión de resultados a bajo costo de investigación; además, permite efectuar estimaciones puntuales y construir intervalos de confianza alrededor del parámetro verdadero de la población.

Los marcos son tratados independientemente desde su construcción hasta la recolección de los datos; sin embargo, a la hora de las estimaciones estos se complementan.

La ESPAC, seleccionó en áreas una submuestra de 2,000 SMs de los 12,277 SMs investigados en la muestra del CNA y una muestra de 4,000 UPAs de lista de las 15,284 unidades investigadas por el CNA. Para esta encuesta en el Marco de Lista, no se tomó en cuenta los estratos 11 y 15 investigados por el CNA-2,000 correspondiente a camaroneras, y en el Marco de Áreas el estrato 72 correspondiente a Centros Poblados Rurales.

4.1 MUESTREO EN DOS FASES PARA LA ESPAC

El diseño de muestreo de la ESPAC utiliza los principios y ventajas del MUESTREO DOBLE O EN DOS FASES, el cual eficientemente combinado con el método del MMM estratificado aplicado en el CNA, tiene la potencialidad de mejorar las estimaciones de las variables en estudio reduciendo sus errores de muestreo para un costo dado. Entonces, mediante el MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE):

- **LA PRIMERA FASE DEL MMA:** está conformada por la muestra GRANDE de 12,277 SMs seleccionada de los 70,000 SMs del MMA en el CNA;
- **LA SEGUNDA FASE DEL MMA:** está integrada por la submuestra PEQUEÑA de 2,000 SMs escogida en la ESPAC de la muestra GRANDE de 12,277 SMs del CNA;
- **LA PRIMERA FASE DEL MML:** está compuesta por el 100 % de las 15,284 UPAs que pertenecieron al MML en el CNA;
- **LA SEGUNDA FASE DEL MML:** está conformada por la muestra PEQUEÑA de 4,000 UPAs seleccionada en la ESPAC del 100 % de las 15,284 UPAs del MML del CNA, a la que se considera como la muestra GRANDE dentro del concepto del MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE).

Es necesario aclarar que, si bien no se conocía el hecho de que cuando se diseñó la muestra del CNA, no se tuvo en cuenta el empleo del MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE) para el sistema de encuestas continuas posteriores al mismo; en el diseño de muestreo de la ESPAC se consideró que este tipo de muestreo ofrecía técnicas de selección y análisis que podrían ser aplicadas, especialmente en el proceso de estimación.

En otras palabras, en la ESPAC el diseño de la submuestra de 2,000 SMs del MMA y de la muestra de 4,000 UPAs del MML (que de aquí en adelante se mencionarán como "muestra PEQUEÑA de segunda fase del MMA" y "muestra PEQUEÑA de segunda fase del MML"), toman a la submuestra de 12,277 SMs como la muestra GRANDE de primera fase y al 100 % de las 15,284 UPAs del MML como la muestra GRANDE de primera fase.

Por otra parte, los tamaños de la submuestra del MMA de 2,000 SMs y de la muestra del MML de 4,000 UPAs de la ESPAC, fueron fijados con base en el presupuesto disponible, sin consideración de grados de precisión, confiabilidad y costos, que son factores a considerarse bajo otras circunstancias cuando se usa el MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE).

Por lo tanto, la eficiencia estadística de las estimaciones generadas por el MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE) se debe a la posibilidad de correlacionar la información obtenida de la muestra de PRIMERA FASE con la información recolectada en la muestra de SEGUNDA FASE.

4.2 MUESTRA PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE DEL MMA: PROCESO DE SELECCIÓN

4.2.1 Objetivos de la Muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA

Con una restricción muy fuerte en el tamaño de muestra predeterminado demasiado pequeño de 2,000 SMs, incrementada a 3,610 SMs en el año 2006, el diseño de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA en la ESPAC persiguió los siguientes objetivos fundamentales:

- Mantener el diseño de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA lo más ajustado posible al diseño del CNA (replicaciones independientes dentro de un estrato en cada Cantón), por múltiples razones estadísticas y técnicas;
- Producir las estimaciones a nivel provincial con grados de precisión y niveles de confiabilidad aceptables, que no sean muy diferentes a los del CNA;
- Diseñar la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA de tal manera que en el futuro permita el incremento del tamaño de la misma, cuando se consigan mayores recursos económicos.

4.2.2 Tamaño de la Muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA

El tamaño de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA fue fijado en 2,000 SMs con base al presupuesto asignado al INEC con anterioridad.

4.2.3 Nivel de las Estimaciones del MMA

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados bajo la restricción de un tamaño de muestra muy pequeño, se adoptó producir las estimaciones para los siguientes niveles:

- Provincias auto-representadas (importancia alta en la producción agropecuaria, especialmente de exportación), que se espera produzcan estimaciones con buenos grados de precisión y niveles de confiabilidad y que mantienen al máximo posible el diseño de muestreo del CNA: Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha. A este grupo se añadió Chimborazo por razones técnicas de facilidad de mantener el diseño del CNA, aún cuando no mantiene las mismas características de las otras cuatro anteriores;
- Provincias no-auto-representadas, que se espera generen estimaciones provinciales con regulares grados de precisión y niveles de confiabilidad y que no mantienen al máximo posible el diseño de muestreo del CNA: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Morona Santiago, Loja y Tungurahua;
- Grupos de Provincias: Nororiente (Napo, Sucumbíos y Orellana); Suroriente (Pastaza y Zamora Chinchipe);
- Áreas no incluidas: Galápagos y Zonas no Asignadas (Las Golondrinas, La Concordia, Manga del Cura y El Piedrero).

4.2.4 Diseño de la Muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE de las Provincias Auto-Representadas

El bosquejo del diseño de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA de las provincias auto-representadas es el siguiente:

- Clasificación mediante la técnica de "ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS (CLUSTER ANALYSIS)" de los cantones de cada provincia en dos Dominios de Estudio (DEs) de acuerdo a variables compuestas de cultivos (permanentes, transitorios y barbecho), pastos (cultivados, naturales y páramos) y superficie total bajo la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA). Estos DEs son:
 - I cantones más importantes;
 - II cantones menos importantes.
- Sub-clasificación de cada DEs en dos Sub-Dominios de Estudio (SDEs) de acuerdo a la estratificación por uso del suelo del CNA. Estos SDEs son:
 - "A": conformado por los cantones, replicaciones y estratos 10, 20 y 30 del CNA 2,000 dentro del DE "I".
 - "B": constituido por los estratos 40 y 51, que previamente fueron colapsados entre cantones dentro del DE "I".
 - "C": integrado por los estratos 10, 20 y 30, que previamente fueron colapsados entre cantones dentro del DE "II".
 - "D": compuesto por los estratos 40 y 51, que previamente fueron colapsados entre cantones dentro del DE "II".
 - El estrato 72 de cabeceras parroquiales y centros poblados de otras áreas rurales no fue incluido en la ESPAC, por su escasa representatividad con respecto a la producción agropecuaria y otras variables correlacionadas.
- Selección sistemática de dos SMs por cada replicación dentro de cada estrato en un cantón, con el método de Brewer con Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPT) de la superficie bajo "cultivos y pastos" o superficie total bajo UPAs en el SDEs "A". En este SDEs "A" se mantiene el diseño de muestreo del CNA;
- Selección sistemática controlada de la submuestra asignada (generalmente con afijación proporcional o igual) de SMs a cada estrato colapsado entre cantones en los SDEs "B", "C" y "D", en los cuales no se mantiene el diseño de muestreo del CNA. Las variables compuestas de control fueron cultivos y pastos o superficie total bajo UPAs y la importancia de la producción agropecuaria en estos SDEs, es generalmente baja;
- Además, se introdujo un factor de ajuste para los cuatro SDEs ("A", "B", "C" y "D") consistente en que los SMs cuyas variables compuestas de cultivos y pastos o superficie total bajo UPAs, eran igual a cero (0), fueron excluidas de la selección sistemática, circunstancia tomado en cuenta en el proceso de estimación.

4.2.5 Diseño de la Muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA en las Provincias No-Auto-Representadas

El diseño de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA en las provincias no-auto-representadas, es similar al de las auto-representadas, salvo que en el SDEs "A" el proceso de selección es el mismo que el de los SDEs "B", "C" y "D". Es importante indicar que en estas provincias no se mantiene el diseño de replicaciones y estratos a nivel cantonal del CNA, pues los estratos fueron colapsados entre cantones, como se indicó en el numeral anterior. Algunas de estas provincias no tienen los cuatro SDEs.

4.2.6 Diseño de la Muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA en las Provincias Agrupadas

El diseño de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MA en las provincias agrupadas, es similar al de las no-auto-representadas, pero los estratos 10, 20, 30, 40 y 51 fueron colapsados entre cantones y provincias.

4.3 Diseño de la Muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MML

El diseño de muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MML es el siguiente:

- Estratificado: mediante los 13 estratos utilizados en el CNA (sin incluir camaroneras);
- Sub-Estratificado: en los estratos 1 y 2 de UPAs grandes y sectoriales respectivamente. Se crearon cuatro sub-estratos, a saber:
 - Sub-Estrato 1: UPAs de menos de 200 Has. de superficie total;
 - Sub-Estrato 2: UPAs de 200 a menos de 500 Has. de superficie total;
 - Sub-Estrato 3: UPAs de 500 a menos de 1,000 Has. de superficie total;
 - Sub-Estrato 4: UPAs de 1,000 Has. y más de superficie total.

4.4 RESUMEN DE LOS TAMAÑOS DE MUESTRA

En el siguiente cuadro presenta un resumen por provincias de las muestras PEQUEÑAS DE SEGUNDA FASE seleccionadas para el MMA y MML de la ESPAC.

ESPAC: RESUMEN DE LOS TAMAÑOS DE MUESTRAS PEQUEÑAS DE SEGUNDA FASE DEL MMA Y MML, SEGÚN PROVINCIAS.

Provincia	MMA							MML		
	Universo	Tamaño submuestra			% submuestra			Universo CNA	Muestra ESPAC	% de la Muestra
		CNA 2,000	ESPAC 2,002	ESPAC 2,006	CNA 2,000	ESPAC 2,002	ESPAC 2,006			
TOTAL	69,272	12,078	2,000	3,610	17.44	16.56	29.89	12,341	4,000	32.41
Azuay	3,117	666	65	200	21.37	9.76	30.03	607	117	19.28
Bolívar	1,864	409	80	120	21.94	19.56	29.34	255	37	14.51
Cañar	1,290	303	40	120	23.49	13.20	39.60	170	130	76.47
Carchi	1,113	285	30	120	25.61	10.53	42.11	238	48	20.17
Cotopaxi	2,351	479	100	200	20.37	20.88	41.75	401	156	38.90
Chimborazo	2,174	500	130	250	23.00	26.00	50.00	406	128	31.53
El Oro	2,320	523	100	150	22.54	19.12	28.68	683	142	20.79
Esmeraldas	4,537	576	80	200	12.70	13.89	34.72	881	240	27.24
Guayas	7,400	1,453	400	450	19.64	27.53	30.97	1,461	859	58.80
Imbabura	1,752	375	50	150	21.40	13.33	40.00	293	103	35.15
Loja	5,126	893	121	200	17.42	13.55	22.40	542	202	37.27
Los Ríos	3,563	749	196	260	21.02	26.17	34.71	687	317	46.14
Manabí	8,603	1,258	298	400	14.62	23.69	31.80	1,775	534	30.08
Pichincha	5,755	774	170	400	13.45	21.96	51.68	1,220	486	39.84
Tungurahua	1,020	304	40	150	29.80	13.16	49.34	573	98	17.10
Morona S.	5,866	669	35	40	11.40	5.23	5.98	1,065	125	11.74
Nor-orient	5,426	1,036	39	120	19.09	3.76	11.58	479	163	34.03
Sur-orient	5,995	826	26	80	13.78	3.15	9.69	605	115	19.01



4.5 PROCESO DE ESTIMACIÓN DE LA ESPAC MEDIANTE EXPANSIÓN DIRECTA

4.5.1 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN DE LA ESPAC MEDIANTE EXPANSIÓN DIRECTA CON LOS DATOS DEL CNA

Las estimaciones y sus errores de muestreo han sido producidos a través del método de EXPANSIÓN DIRECTA.

De los análisis realizados se indica, que para los tamaños de muestras establecidos con la restricción del presupuesto escaso disponible, para las principales variables estimadas de la ESPAC se puede esperar lo siguiente:

- Estimaciones muy buenas a nivel nacional y regional;
- Estimaciones buenas a nivel de las cinco provincias auto-representadas (Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha y Chimborazo);
- Estimaciones regulares para el resto de provincias.

La expectativa de la última viñeta anterior, debe llevar a estudiar detenidamente diferentes alternativas para mejorar la eficiencia de las estimaciones:

- Colapsar provincias: las seis de la amazonía pueden agruparse en una sola, por ejemplo;
- Utilizar los métodos de razón y regresión aprovechando de que se ha empleado el MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE) en el proceso de selección de las muestras PEQUEÑAS DE SEGUNDA FASE, tanto del MMA como del MML;
- Experimentar nuevos métodos de estimación, como el de razón y regresión, sin usar el MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE).

4.5.2 FACTOR ORIGINAL Y FINAL DE EXPANSIÓN DIRECTA DE UN ESTRATO EN LA MUESTRA PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE DEL MMA

En general, en un estrato de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA, la fracción de muestreo o probabilidad de selección de un SM y su correspondiente Factor Original de Expansión Directa ($MA_{FOED_{ESPA}}C$) y Factor Final de Expansión Directa ($MA_{FFED_{ESPA}}C$) dentro de un estrato, responde a: Lógicamente, un $MA_{FOED_{ESPA}}C$ y un $MA_{FFED_{ESPA}}C$ de un estrato se calculan de acuerdo a las características peculiares del diseño de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MMA de la ESPAC en cada provincia.

4.5.3 FACTOR ORIGINAL Y FINAL DE EXPANSIÓN DIRECTA DE UN ESTRATO DE LA MUESTRA PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE DEL MML

En general, en un estrato de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE del MML, la fracción de muestreo o probabilidad de selección de una UPA y su correspondiente Factor Original de Expansión Directa ($ML_{FOED_{ESPA}}C$) y Factor Final de Expansión Directa ($ML_{FFED_{ESPA}}C$) dentro de un estrato (ver Anexo 1).

4.5.4 PROCESO DE ESTIMACIÓN POR EXPANSIÓN DIRECTA DE LAS PROVINCIAS AUTO-REPRESENTADAS EN EL MMA DE LA ESPAC

4.5.4.1 Dominio de Estudio (DEs) "A" del MMA

En el SDEs "A" se sigue el mismo diseño de muestreo del CNA, seleccionando independientemente los SMs dentro de cada replicación de un estrato en un Cantón, también las estimaciones, tanto del TOTAL de una variable como de su varianza, siguen los mismos cinco pasos y emplean las mismas fórmulas descritas y presentadas en el CNA.

4.5.4.2 Dominios de Estudio (DEs) B, C y D del MMA

Dado que en estos DEs no se emplea el diseño por replicaciones dentro de un estrato y Cantón, el proceso de estimación es el siguiente:

- **TOTAL de una Variable:** se utilizan los mismos cinco pasos aplicados en el SDEs "A", teniendo en cuenta que el nivel del SDEs sustituye al de Cantón;
- **Varianza del TOTAL de una variable:** también en este caso el nivel del SDE reemplaza al del Cantón, pero la fórmula del cálculo de la varianza de un estrato tiene que modificarse ligeramente ya que no se consideran las replicaciones. A continuación se presenta las fórmulas SAS debidamente adecuadas para la estimación por Expansión Directa del TOTAL de una variable y de su varianza (ver Anexo 2).

4.6 PROCESO DE ESTIMACIÓN POR EXPANSIÓN DIRECTA DE LAS PROVINCIAS NO AUTO-REPRESENTADAS EN EL MMA DE LA ESPAC

En los SDEs 'A, B, C y D' de las provincias no auto-representadas en el MMA de la ESPAC, para el proceso de estimación mediante Expansión Directa, se emplean las mismas fórmulas aplicadas para los SDEs 'B, C y D' de las provincias auto-representadas que constan en el numeral anterior.

4.7 PROCESO DE ESTIMACIÓN POR EXPANSIÓN DIRECTA EN EL MML DE LA ESPAC

Para la estimación por Expansión Directa del TOTAL de una variable y de su varianza en los estratos 1 y 2 (grupos 1, 2, 3 y 4) y 3-14 (no se incluye el 11 y 15) del MML en la ESPAC (ver Anexo 3).

4.8 PROCESO DE ESTIMACIÓN DE LA ESPAC MEDIANTE RAZÓN Y REGRESIÓN

El método del MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE) usado en la ESPAC, además del proceso de Expansión Directa descrito en el capítulo anterior, permite aplicar una serie de otros procesos de estimación, siendo los más comunes el de RAZÓN y REGRESIÓN, a fin de aprovechar la correlación que existe entre la muestra GRANDE DE PRIMERA FASE (CNA) y la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE (ESPAC), para mejorar la precisión de la estimación de una variable cualquiera investigada en la misma.

4.9 PROCESO DE ESTIMACIÓN DE LA ESPAC MEDIANTE RAZÓN

Este método de estimación del TOTAL de una variable y de su varianza en la ESPAC, tanto en un estrato del MMA como del MML (ver Anexo 4).

4.10 PROCESO DE ESTIMACIÓN DE LA ESPAC MEDIANTE REGRESIÓN

Este método de estimación del TOTAL de una variable y de su varianza en la ESPAC, tanto en un estrato del MMA como del MML (ver Anexo 5).

5 TRATAMIENTO DE CULTIVOS ASOCIADOS

Los productos agrícolas componentes de un asociado están relacionados únicamente por la superficie física que comparten en el área sembrada o plantada, de tal forma que no es posible determinar el área individual de cada componente del asociado, por lo que requieren ser tratados en forma conjunta, así por ejemplo: si tenemos 1 Ha. de café asociado con cacao los resultados presentados por la ESPAC serán: 1Ha. de café y 1 Ha. de cacao en el rubro de asociado respectivamente, razón por la cual no habrá consistencia entre la tabla de permanentes y uso del suelo.

6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El ámbito de investigación de la ESPAC constituye todo el territorio continental excepto Galápagos y las Zonas no Asignadas (Las Golondrinas, La Concordia, Manga del Cura y El Piedrero).

7 PERÍODO DE ENCUESTAMIENTO

La recolección de los datos se la efectúa durante los meses de octubre a diciembre del año de la investigación en el área rural, mediante entrevista directa a los productores agropecuarios.

8 CONSIDERACIÓN

Por ser los tamaños de muestra demasiado pequeños, en las provincias de Napo, Sucumbios y Orellana, se agruparon los resultados en Nororiente y las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe en Centro-Suroriente

9 SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS

En el texto y las tablas presentadas en esta publicación se han utilizados algunos símbolos y abreviaturas cuyo significado es el siguiente:

- * (asterisco) Dato oculto por confiabilidad y confidencialidad estadística.
- . (punto) sin información.

Has. Hectáreas.
Tm. Toneladas métricas.

10 GLOSARIO

CNA .-	CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
MMM .-	Muestreo de Marcos Múltiples
MML .-	Muestreo del Marco de Lista
ML .-	Marco de Lista
MMA .-	Muestreo del Marco de Área
MA .-	Marco de Área
UPA .-	Unidad de Producción Agropecuaria
SM .-	Segmento de Muestreo
DEs .-	Dominios de Estudio
SDEs .-	Subdominio de Estudios
FOED .-	Factor Original de Expansión Directa
FFED .-	Factor Final de Expansión Directa
SAS .-	Sistema De Análisis Estadístico



ANEXO I

$${}_M f_{ESPAC(f)} = {}_M f_{CNA(G)} * {}_M f_{ESPAC(p)} = \frac{{}_M n_{CNA(G)}}{{}_M N_{CNA}} * \frac{{}_M n_{ESPAC(p)}}{{}_M n_{CNA(G)}} = \frac{{}_M N_{CNA}}{{}_M N_{CNA}} * \frac{{}_M n_{ESPAC(p)}}{{}_M N_{CNA}} = \frac{{}_M n_{ESPAC(p)}}{{}_M N_{CNA}},$$

donde :

${}_M f_{ESPAC(f)}$ = Fracción de muestreo final de la ESPAC en el ML ;

${}_M f_{CNA(G)} = 1$ = Fracción de la muestra GRANDE DE PRIMERA FASE del CNA en el ML ;

${}_M f_{ESPAC(p)}$ = Fracción de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE de la ESPAC en el ML ;

${}_M n_{CNA(G)} = {}_M N_{CNA}$ = No. de UPAs de la muestra GRANDE DE PRIMERA FASE del CNA en el ML ;

${}_M N_{CNA}$ = No. de UPAs en la población del CNA en el ML ;

${}_M n_{ESPAC(p)}$ = No. de UPAs de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE de la ESPAC en el ML .

Por lo tanto, el Factor Original de Expansión Directa en el ML es :

$${}_M FOED_{ESPAC} = \frac{1}{{}_M f_{ESPAC(f)}} = \frac{{}_M N_{CNA}}{{}_M n_{ESPAC(p)}},$$

donde :

${}_M FOED_{ESPAC}$ = Factor Original de Expansión Directa de la ESPAC en el ML .

Luego, el ${}_M FOED_{ESPAC}$ tiene que ser ajustado de la siguiente forma para obtener el Factor Final de Expansión Directa en el ML :

$${}_M FFED_{ESPAC} = {}_M FOED_{ESPAC} * {}_M FA_{ds} * {}_M FA_{cob} * {}_M FA_{res},$$

donde :

${}_M FFED_{ESPAC}$ = Factor Final de Expansión Directa de la ESPAC en el ML ;

$${}_M FA_{ds} = \frac{{}_M ds_{G2}}{{}_M ds_{G1}} = \text{Factor Ajuste por diseño de la muestra PEQUEÑA de la ESPAC en el ML,}$$

pero calculado en la muestra GRANDE DE PRIMERA FASE del CNA ,

donde :

(i) En los estratos 1 y 2, subestratos (grupos) 1, 2 y 3 (no incluye el 4), el ${}_M FA_{ds}$ es :

$${}_M FA_{ds} = \frac{{}_M ds_{G2} = \text{No de UPAs por estrato con la variable de control } > 0 \text{ en el CNA}}{{}_M ds_{G1} = \text{No de UPAs por subestrato (grupo) del CNA en el ML}},$$

con la 'Variable de Control' = Cultivos (permanentes + transitorios + barbecho) + Pastos (cultivados + naturales + páramos) ;


(ii) En los estratos 4 al 14 (sin incluir 11 y 15 de amaroneras) , el ${}_M FA_{ds}$ es :

$${}_M FA_{cob} = \frac{{}_M ds_{G2} = \text{No de UPAs por estrato con la variable de control } > 0 \text{ en el CNA}}{{}_M ds_{G1} = \text{No de UPAs por estrato del CNA en el ML}},$$

con la 'Variable de Control' = Característica que define el estrato (flores , maracujá , ... , mango , brócoli , palmito , ajes , porcinas , etc .);

${}_M FA_{cob}$ = Factor de Ajuste por la falta de cobertura de la ESPAC en el ML ;

${}_M FA_{res}$ = Factor de Ajuste por la falta de respuesta de la ESPAC en el ML .



FÓRMULAS 'SAS' POR ESTRATO EMPLEADAS EN LOS DOMINIOS B, C y D DE LAS PROVINCIAS AUTO – PONDERADAS EN EL MA DE LA ESPAC

$${}_{SAS}\hat{Y}_h = \sum_{i=1}^{n_h} {}_{SAS}\hat{Y}_{hi} = \sum_{i=1}^{n_h} {}_{MA}FFED_{hi} {}_p y_{hi},$$

donde :

${}_{SAS}\hat{Y}_h$ = Estimación 'SAS' del TOTAL de una variable en el estrato h – ésimo del MA;

${}_{SAS}\hat{Y}_{hi}$ = Estimación 'SAS' del TOTAL de una variable en el i – ésimo SM
del estrato h – ésimo del MA;

${}_{MA}FFED_{hi}$ = Factor Final de Expansión Directa en el i – ésimo SM
del estrato h – ésimo del MA;

${}_p y_{hi}$ = Total ponderado de una variable en la muestra del i – ésimo SM
en el estrato h – ésimo del MA;

n_h = Número de SMs de la muestra en el estrato h – ésimo del MA.

$$\text{var}({}_{SAS}\hat{Y}_h) = \left(1 - \frac{n_h}{N_h}\right) \frac{\sum_{i=1}^{n_h} (\hat{Y}_{hi} - \hat{\bar{Y}}_h)^2}{n_h - 1},$$


donde :

$\text{var}({}_{SAS}\hat{Y}_h)$ = varianza de la estimación 'SAS' del TOTAL de una variable
en el estrato h – ésimo del MA;

$$\hat{\bar{Y}}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h} \hat{Y}_{hi}}{n_h} = \text{Media de la estimación 'SAS' del TOTAL de una variable}$$

en el estrato h – ésimo del MA;

N_h = Número de SMs en la población del estrato h – ésimo del MA.



ANEXO 3

FÓRMULAS 'SAS' POR ESTRATO EMPLEADAS EN EL ML DE LA ESPAC

$${}_{SAS}\hat{Y}_h = \sum_{i=1}^{n_h} {}_{SAS}\hat{Y}_{hi} = \sum_{i=1}^{n_h} {}_{ML}FFED_{hi} y_{hi},$$

donde:

${}_{SAS}\hat{Y}_h$ = Estimación 'SAS' del TOTAL de una variable en el estrato h – ésimo del ML;

${}_{SAS}\hat{Y}_{hi}$ = Estimación 'SAS' del TOTAL de una variable en la i – ésima UPA del estrato h – ésimo del ML;

${}_{ML}FFED_{hi}$ = Factor Final de Expansión Directa en la i – ésima UPA del estrato h – ésimo del ML;

y_{hi} = Total de una variable en la muestra de la i – ésima UPA en el estrato h – ésimo del ML;

n_h = Número de UPAs de la muestra en el estrato h – ésimo del ML.


$$\text{var}({}_{SAS}\hat{Y}_h) = \left(1 - \frac{n_h}{N_h}\right) \frac{\sum_{i=1}^{n_h} (\hat{Y}_{hi} - \hat{\bar{Y}}_h)^2}{n_h - 1},$$

donde:

$\text{var}({}_{SAS}\hat{Y}_h)$ = varianza de la estimación 'SAS' del TOTAL de una variable en el estrato h – ésimo del ML;

$$\hat{\bar{Y}}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h} \hat{Y}_{hi}}{n_h} = \text{Media de la estimación 'SAS' del TOTAL de una variable en el estrato } h \text{ – ésimo del ML;}$$

N_h = Número de UPAs en la población del estrato h – ésimo del ML.



ANEXO 4

$$\hat{Y}_r = \frac{\hat{Y}_p}{\hat{X}_p} \hat{X}_G = R_d \hat{X}_G,$$

donde :

\hat{Y}_{rd} = Estimación de RAZÓN del TOTAL de una variable en un estrato de la ESPAC con MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE) ;

\hat{Y}_p = Estimación por Expansión Directa del TOTAL de una variable desde un estrato de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE en la ESPAC ;

\hat{X}_p = Estimación por Expansión Directa del TOTAL de la misma variable anterior (\hat{Y}_p) desde un estrato de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE , pero obtenida con datos del CNA ;

$R_d = \frac{\hat{Y}_p}{\hat{X}_p}$ = Razón entre la variable (\hat{Y}_p) y la variable (\hat{X}_p) en un estrato de la ESPAC con MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE) ;

\hat{X}_G = Estimación por Expansión Directa del TOTAL de la misma variable anterior \hat{Y}_p desde un estrato de la muestra GRANDE DE SEGUNDA FASE en el CNA .

$$\text{var}(\hat{Y}_r) = \frac{1}{n_p} (s_{\hat{Y}_p}^2 + R_d^2 s_{\hat{X}_p}^2 - 2R_d s_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}) + \frac{2R_d s_{\hat{Y}_p \hat{X}_p} - R_d^2 s_{\hat{X}_p}^2}{n_G},$$

donde:

$\text{var}(\hat{Y}_r)$ = varianza de la estimación de RAZÓN del TOTAL de una variable en un estrato de la ESPAC con MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE);


n_G = Tamaño de la muestra (SMso UPA) GRANDE DE PRIMERA FASE en el CNA

n_p = Tamaño de la muestra (SMso UPA) PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE en la ESPAC;

$s_{\hat{Y}_p}^2$ = varianza de (\hat{Y}_p);

$s_{\hat{X}_p}^2$ = varianza de (\hat{X}_p);

$s_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}$ = covarianza de (\hat{Y}_p, \hat{X}_p).



ANEXO 5

$${}_{ESPAC}\hat{Y}_{rgd} = {}_{ESPAC}\hat{Y}_p + B_d ({}_{CNA}\hat{X}_G - {}_{CNA}\hat{X}_p),$$

donde:

${}_{ESPAC}\hat{Y}_{rgd}$ = Estimación de REGRESIÓN del TOTAL de una variable en un estrato de la ESPAC con MUESTREO EN DOS FASES (DOBLE);


$$B_d = \frac{\sum_{i=1}^{n_p} ({}_{ESPAC}\hat{Y}_{ip} - {}_{ESPAC}\hat{Y}_p) ({}_{CNA}\hat{X}_{ip} - {}_{CNA}\hat{X}_p)}{\sum_{i=1}^{n_p} ({}_{CNA}\hat{X}_{ip} - {}_{CNA}\hat{X}_p)^2}$$

= Coeficiente de REGRESIÓN de la variable (${}_{ESPAC}\hat{Y}_p$) con la (${}_{CNA}\hat{X}_p$) en un estrato de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE en la ESPAC,

donde:

${}_{ESPAC}\hat{Y}_p$ = Media de la estimación del TOTAL de la variable (${}_{ESPAC}\hat{Y}_p$) en un estrato de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE en la ESPAC;

${}_{CNA}\hat{X}_p$ = Media de la estimación del TOTAL de la variable (${}_{CNA}\hat{X}_p$) en un estrato de la muestra PEQUEÑA DE SEGUNDA FASE, pero obtenida con datos del CNA.



FÓRMULAS APROXIMADAS DE LA VARIANZA DE LA ESTIMACIÓN POR REGRESIÓN DEL TOTAL DE UNA VARIABLE EN UN ESTRATO DEL MA o ML EN LA ESPAC

PRIMERA FÓRMULA DE W.G. COCHRAN

$$\text{var}(\text{ESPAC } \hat{Y}_{rgd}^{C_1}) = \frac{s_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}^2}{n_p} + \frac{s_{\hat{Y}_p}^2 - s_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}^2}{n_g} - \frac{s_{\hat{Y}_p}^2}{N},$$

donde :

$\text{var}(\text{ESPAC } \hat{Y}_{rgd}^{C_2})$ = varianza de la estimación por REGRESIÓN del TOTAL de una variable en un estrato de la ESPAC con MUESTREO EN DOS FASES ;

$$s_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}^2 = \frac{1}{n_p - 2} \left[\sum_{i=1}^{n_p} (\text{ESPAC } \hat{Y}_{ip} - \text{ESPAC } \hat{Y}_p)^2 - B_d^2 \sum_{i=1}^{n_p} (\text{CNA } \hat{X}_{ip} - \text{CNA } \hat{X}_p)^2 \right];$$

N = Número de SIMs en la población del MA o número de UPAs en la población del ML.

SEGUNDA FÓRMULA DE W.G. COCHRAN

$$\text{var}(\text{ESPAC } \hat{Y}_{rgd}) = s_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}^2 \left[\frac{1}{n_p} + \frac{(\text{CNA } \hat{X}_G - \text{CNA } \hat{X}_p)^2}{\sum_{i=1}^{n_p} (\text{CNA } \hat{X}_{ip} - \text{CNA } \hat{X}_p)^2} \right] + \frac{s_{\hat{Y}_p}^2 - s_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}^2}{n_g} - \frac{s_{\hat{Y}_p}^2}{N}.$$

FÓRMULA DE L. KISH

$$\text{var}(\text{ESPAC } \hat{Y}_{rgd}^K) = \frac{(s_{\hat{Y}_p}^2 - \square_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}^2)}{n_p - 2} + \frac{\square_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}^2 s_{\hat{Y}_p}^2}{n_g},$$

donde :

$$\square_{\hat{Y}_p \hat{X}_p} = \frac{\sum_{i=1}^{n_p} (\text{ESPAC } \hat{Y}_{ip} - \text{ESPAC } \hat{Y}_p)(\text{CNA } \hat{X}_{ip} - \text{CNA } \hat{X}_p)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_p} (\text{ESPAC } \hat{Y}_{ip} - \text{ESPAC } \hat{Y}_p)^2 \sum_{i=1}^{n_p} (\text{CNA } \hat{X}_{ip} - \text{CNA } \hat{X}_p)^2}} = \text{coeficiente de correlación entre}$$

las variables $(\text{ESPAC } \hat{Y}_{ip}, \text{CNA } \hat{X}_{ip})$;

$$\square_{\hat{Y}_p \hat{X}_p}^2 = \text{coeficiente de determinación entre las variables } (\text{ESPAC } \hat{Y}_{ip}, \text{CNA } \hat{X}_{ip}).$$



ESPAC 2008

ECUADOR CUENTA CON EL INEC

PUBLICACIÓN IMPRESA		PRECIO EN CD - MULTIMEDIA	
DENTRO DEL PAIS	USD \$ 9,00	DENTRO DEL PAIS	USD \$ 5,00
EXTERIOR:		EXTERIOR:	
VIA AEREA PARA		VIA AEREA PARA	
AMERICA LATINA	USD \$ 12,75	AMERICA LATINA	USD \$ 8,26
VIA AEREA		VIA AEREA	
RESTO DEL MUNDO	USD \$ 16,75	RESTO DEL MUNDO	USD \$ 9,31

Esta publicación fue preparada e impresa en el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
QUITO, Marzo del 2009

TIRAJE 35 EJEMPLARES

Estos precios no incluyen el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

